PREHRANA KRAV MOLZNIC / BOLUSI

BOLITRACE BIOTIN

Močni parklji tudi v naslednji laktaciji. Dolgotrajna oskrba z biotinom, vitamini in elementi v sledovih že z enim odmerkom ob presušitvi.



2 BOLUSA OB PRESUŠITVI IN 120 DNI DELOVANJA

PRIPRAVA NA NASLEDNJO LAKTACIJO SE ZAČNE OB PRESUŠITVI

Kakovost parkljev se gradi postopoma. Kratka ali neuravnotežena oskrba z biotinom, vitamini in elementi v sledovih se zato ne pokaže čez noč.

BOLITRACE BIOTIN se aplicira ob začetku presušitve. Dva bolusa zagotavljata nadzorovano sproščanje hranil 120 dni in tako podpirata kravo tudi ob prehodu v novo laktacijo.

POMEMBNO/ZANIMIVO

- 1 odmerek = 2 bolusa
- 20 mg biotina na dan
- 120 dni nadzorovanega sproščanja
- vsebuje vitamine A, D3 in E
- 6 elementov v sledovih.

OPOMNIK

Aplicirajte takoj ob začetku presušitve.

Ljubljanske mlekarne d.o.o., Tolstojeva 63, 1000 Ljubljana

www.agrooskrba.si | Facebook | YouTube

PODROBNEJŠE INFORMACIJE

Stran za razlago, prednosti, tehnične podatke, priporočila ali ponudbo.

PREDNOSTI

- 120 dni postopnega sproščanja,
- 20 mg biotina na dan,
- enkratna aplikacija ob presušitvi,
- vitamini A, D3 in E,
- cink, baker, mangan, jod, kobalt in selen,
- preprosta rešitev za dolgotrajno oskrbo.

TEHNIČNI PODATKI / OPIS

- **Trajanje delovanja:** 120 dni
- **Odmerek:** 2 bolusa na kravo
- **Čas uporabe:** začetek presušitve
- **Namen:** presušene krave molznice
- **Biotin:** 20 mg/dan
- **Najmanjša masa živali:** 400 kg
- **Način aplikacije:** oralno z aplikatorjem za boluse

PRIPOROČILA

Kdaj uporabiti?
Ob začetku presušitve, da sproščanje hranil pokrije celotno suho dobo in prehod v novo laktacijo.
Pred uporabo preverite mineralno-vitaminske dodatke v obroku.

ALI STE VEDELI?

Parkelj zraste približno 5 do 7 mm na mesec.
Kakovost parkljev zato ni odvisna le od redne nege in korekcije, temveč tudi od dolgotrajne oskrbe živali s hranili, ki sodelujejo pri nastajanju roževine.

NAVODILA ZA UPORABO

1. Ob začetku presušitve oralno aplicirajte 2 bolusa z ustreznim aplikatorjem.
2. Ne aplicirajte ležečim živalim ali živalim, lažjim od 400 kg.
3. V času 120-dnevnega delovanja preverite oskrbo z vitaminom D3, kobaltom, bakrom, jodom, manganom, selenom in cinkom iz drugih virov. Ne uporabljajte sočasno z izdelki, ki vsebujejo vitamin D2.
4. Pred uporabo se posvetujte s strokovnjakom za prehrano živali ali veterinarjem.

ZA INFORMACIJE ALI NAROČILO POKLIČITE

- **Gregor Rupnik: 031 389 765**
- **Majda Ferlič Knedl: 040 632 950**
- **Leja Hercigonja: 030 488 873**